レインボー薬品

芝生のお手入れ どうするBOOK

WEB公開中!!

詳しくは レインボー薬品公式チャンネル で検索!

◀解決方法はこちら!!

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS
レインボー薬品は持続可能な開発目標(SDGs)を支援しています。

レインボー薬品株式会社 www.rainbow-f.co.jp
〒110-0005 東京都台東区上野1-19-10
TEL. 03-6740-7777(平日/9:00~17:00)
SCC GROUP 住友化学 アグログループ

3.1202_50000_820200426

レインボー薬品

雑草対策 どうするBOOK

WEB公開中!!

詳しくは ネコソギどっち で検索!

解決方法はこちら!!▶

除草剤選びを強力サポート!

スマホWEBサイト 除草剤選び.com

様々な切り口から除草剤を検索できます!

▶https://www.jyosouzaierabi.com

※画像はイメージです。

除草剤やコケ駆 除剤どう選ぶ??

長期間、雑草を生やしたくない。

持続性のある粒剤

土壌処理型除草剤がおすすめ



P4-5

土壌処理型

速く枯らして長期間雑草を生やしたくない。

速効・持続性のある液剤

土壌処理型+茎葉処理型除草剤がおすすめ



P6-7

土壌処理型+茎葉処理型

生えている雑草だけすばやく枯らしたい。

樹木まわりの雑草を枯らしたい。

速効性のある液剤

茎葉処理型除草剤がおすすめ

P8-9

茎葉処理型

コケを枯らしたい。

コケ駆除剤をお使いをください ※農薬ではありません

P16-17

コケ駆除剤

キレイな芝生にしたい。

芝生専用除草剤・芝生資材をお使いください

P20-23

芝生専用

レインボー薬品の家庭用除草剤は、全て普通物（毒物・劇物には該当しないものを指していう通称）です。植物特有の生理代謝機能（例:光合成）を阻害して雑草を枯らします。土壌中の成分は微生物の働きにより分解されます。「枯れ葉剤」問題の原因であるダイオキシン類は含まれておりません。

最適! 除草カレンダー …… P11

農薬を散布するときの注意 …… P13

よく見かける雑草と対応薬剤 …… P14-15

お手入れ3つの基本 キレイな芝生に …… P18-19

持続性のある粒剤

土壌処理型除草剤

土壌処理型除草剤は、成分がいったん土壌に移行して、雑草の根から吸収され徐々に雑草を枯らします。それと共に土壌に処理層を形成するので、長期間雑草の発生を抑えることができます。

こんな場所に　駐車場　空き地　家まわり　運動場　墓地

土壌処理型

信頼の黄色のネコソギ ❶ネコソギ粒剤

WEBサイト ネコソギどっち?

幅広い草種に対応しています。

パラパラまくだけ　枯れ始め目安 7～14日後　雑草抑制期間 約6ヶ月※

※土壌条件、気象条件、使用量等によって差が生じます。

2kg・3kg（箱タイプ）は散布器&手袋付

頑固な雑草にも効く　スギナ

■容量と適用面積　例:ネコソギエースV粒剤の場合

350g	12～	70㎡（約　4～21坪）
800g	27～	160㎡（約　8～48坪）
2kg	67～	400㎡（約　20～120坪）
3kg	100～	600㎡（約　30～180坪）
5kg 袋	167～1,000㎡	（約　50～303坪）
10kg 袋	333～2,000㎡	（約100～606坪）

生える前～草丈20cm以下の散布がおすすめ!

※ネコソギエースV粒剤30g/㎡散布時

※散布イメージ

ネコソギ粒剤には種類がいくつかございます。商品ラベルの記載に従って散布してください。

▶散布後の変化（30g※/㎡散布時）

※ネコソギエースV粒剤

極みの黒のネコソギ ❷ネコソギトップW粒剤

WEBサイト ネコソギどっち?

幅広い草種に対応しています。

■農林水産省登録 第23858号
■成分:アミカルバゾン（トリアゾリノン系）、ブロマシル（ダイアジン系）
■容量と適用面積

800g	20～　160㎡用（約　6～　48坪）
3kg	75～　600㎡用（約23～180坪）
5kg 袋	125～1,000㎡用（約38～303坪）

枯れ始め目安 7～14日後　パラパラまくだけ

雑草抑制期間 最長9※2ヶ月　ネコソギ史上最長!!

※土壌条件、気象条件、使用量等によって差が生じます。

3kgは散布器&手袋付

頑固な雑草にも効く　ササ　ススキ

草丈40※2cmの雑草も枯らす!

※2　20～40g/㎡散布時。土壌条件、気象条件、使用量等によって効果に差が生じます。

もう雑草を生やしたくない場所に

雑草が伸びる前にまくと、暑い夏に草むしりの必要がありません。※3

※3 土壌や気象条件、散布時期、使用量、草の種類等により差が生じます。

雑草生育カレンダー



効果が続くから、手間いらず!

1度の散布でキレイが続きます。最長9ヶ月※2雑草を生やしません。

▶散布後の変化（2016年12月 20g/㎡散布時）

土壌処理型除草剤　粒剤のまき方

散布当日　ある程度、土壌が湿っている時がおすすめです。



雑草が育っている場合は…



刈りカスや枯れ草が地面を覆っているときは、取り除いてから散布してください。

注意事項

- 植木等枯らしたくない植物の根が生えていると思われる場所には散布しないよう、十分注意してください。
- 傾斜地では使用しないでください。
- 効果にムラが出ないように、散布当日はその場所に入らないでください。

※それぞれの商品ラベルの記載に従って散布します。

使用時期の目安

▶こんな雑草に!

※写真は生育期のものです

これは抜粋です。詳細はP14～15へ

速効・持続性のある液剤

土壌処理型＋茎葉処理型除草剤

土壌処理型+茎葉処理型除草剤は、成分が植物の葉や茎から吸収され、すばやく枯らします。さらに、異なる成分が土壌に移行して、雑草の根からも吸収され徐々に雑草を枯らします。それと同時に土壌に処理層を形成するので、長期間雑草の発生を抑えることができます。

極みの黒のネコソギ

③ネコソギロングシャワーV8

WEBサイト ネコソギどっち?

- 農林水産省登録 第24114号
- 成分:グリホサートイソプロピルアミン塩(アミノ酸系)、ブロマシル(ダイアジン系)、メコプロップPカリウム塩(フェノキシ酸系)
- 容量と適用面積

800mℓ	7～ 40㎡(約 2～12坪)
2ℓ	17～100㎡(約 5～30坪)
5ℓ	42～250㎡(約13～75坪)

頑固な雑草にも効く ササ ススキ コケ ドクダミ イシクラゲ

そのままかけるだけ

枯れ始め目安 2～7日後

雑草抑制期間 最長8※ヶ月

※土壌条件、気象条件、使用量等によって差が生じます。

ネコソギ液剤史上最長!!

粒剤では効きづらい こんなすき間や砂利にも

スプレータイプ

シャワータイプ

シャワータイプ

▶散布後の変化(60mℓ/㎡散布時)

※土壌や気象条件、散布時期、使用量、草の種類等により差が生じます。



薄めずそのままかけるだけ!

伸びてしまった雑草※も大丈夫!

※草丈30cmまで



土壌処理型+茎葉処理型 液剤のまき方

散布当日 天気が良く、風のない日に散布しましょう。
(散布後すぐに雨が降ると、薬剤が流されてしまい十分な効果が現れません)

成分は葉や茎や根から吸収されるので、
雑草全体にしっかり薬剤がかかるように散布する。
長期間、効かせたい場合は
使用量の範囲内で土壌に十分
染み込むようように散布する。



すばやく長く効く仕組み

注意事項

- 植木等枯らしたくない植物の根が生えていると思われる場所には散布しないよう、十分注意してください。
- 風が強いと薬剤が飛散し、思わぬところの植物を枯らしてしまう場合があるので、十分注意してください。
- 成分は数時間で植物に移行します。
- 散布直後に散布場所を歩き回ると、薬剤が落ちてしまい効果にムラが出てしまうことがあるので、散布当日はその場所へ入らないようにしてください。

使用時期の目安 ※それぞれの商品ラベルの記載に従って散布します。

1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
			●						●		

伸びた雑草に!雑草の生育期がとくにまき時です!
(スポット散布にも使いやすい)

こんな場所に

駐車場 家まわり 運動場 墓地

頑固な雑草などにも効果的!

ドクダミに!

ネコソギロングシャワーV8
60mℓ/㎡散布時

イシクラゲ※

ネコソギロングシャワーV8
120mℓ/㎡散布時

※ネコソギロングシャワーV8は3ヶ月間イシクラゲの増殖を抑え、ゆっくりと枯らします。

イシクラゲとは? 詳細はP16へ

▶こんな雑草に!

※写真は生育期のものです

これは抜粋です。詳細はP14～15へ

速効性のある液剤

茎葉処理型除草剤

茎葉処理型除草剤は、成分が植物の葉や茎から吸収されます。茎葉処理型の多くは、成分が土壌に落ちるとすばやく不活性化するので、植物の根から吸収されることはありません。そのため、樹木のまわりや、これから植物を植える予定がある場所の除草に適しています。すばやく効果が出ますが、雑草の発生を抑える効果はありません。
（ネコソギWクイック微粒剤を除く）

どのような雑草に効くかはP14～15へ

④ネコソギWクイック微粒剤 微粒剤タイプ

こんな場所に：駐車場／家まわり／庭・樹木まわり

やっかいなドクダミにも効果を発揮。
伸びた雑草（50cm以下）にも使え、
2つの有効成分が雑草を
すばやく根まで枯らします。

■農林水産省登録 第21993号
■成分：グリホサートイソプロピルアミン塩
（アミノ酸系）、フルミオキサジン
（フェニルフタルイミド系）
■容量と適用面積

600g	20～ 60㎡（約6～18坪）

樹木類の下草除草もOK!

枯れ始め目安 2～7日後
雑草抑制期間 約3ヶ月※
※土壌条件、気象条件、使用量等によって差が生じます。

頑固な雑草にも効く：ドクダミ

そのままかけるだけ

⑤ネコソギクイックプロFL

こんな場所に：家まわり／庭・樹木まわり／畑／果樹園

水で薄めて使う除草剤。
畑等でも使用できます。

■農林水産省登録 第21593号
■成分：グリホサートイソプロピルアミン塩
（アミノ酸系）、
ピラフルフェンエチル（ダイアゾール系）
■容量と適用面積

700㎖	175～ 1,750㎡（約 53～ 530坪）
5ℓ	1,250～12,500㎡（約379～3,787坪）

薄めて使う

枯れ始め目安 1～7日後
雑草抑制期間 持続効果無し
※土壌条件、気象条件、使用量等によって差が生じます。

頑固な雑草にも効く：竹／つる性植物／ススキ・ササ／ドクダミ

竹の枯らし方

地上30～100㎝の節間に穴を開け、竹1本当り「ネコソギクイックプロFL」の原液を10～20㎖注入してください。竹は枯れるまで数ヶ月かかります。

⑥ネコソギクイックプロシャワー

こんな場所に：駐車場／家まわり／庭・樹木まわり

2つの有効成分が雑草をすばやく
根まで枯らします。

■農林水産省登録 第23279号
■成分：グリホサートイソプロピルアミン塩
（アミノ酸系）、
ピラフルフェンエチル（ダイアゾール系）
■容量と適用面積

1000㎖	5～16㎡（約1.5～ 5坪）
2ℓ	10～33㎡（約 3～10坪）

かんきつ類の下草除草もOK!

枯れ始め目安 1～7日後
雑草抑制期間 持続効果無し
※土壌条件、気象条件、使用量等によって差が生じます。

頑固な雑草にも効く：スギナ

そのままかけるだけ／シャワータイプ

⑦ネコソギガーデンシャワー

こんな場所に：家まわり／庭・樹木まわり／畑

アミノ酸系成分を使用した、薄めず
そのまま散布できるシャワー除草
剤。家周りだけでなく、畑でも使える
（※適用作物に限る）。

■農林水産省登録 第23171号
■成分：グリホサートイソプロピルアミン塩
（アミノ酸系）
■容量と適用面積

1000㎖	25～ 50㎡（約7.5～15坪）
2ℓ	50～100㎡（約15～ 30坪）
5ℓ	125～250㎡（約38～ 75坪）

枯れ始め目安 2～7日後
雑草抑制期間 持続効果無し
※土壌条件、気象条件、使用量等によって差が生じます。

そのままかけるだけ／シャワータイプ

⑧ネコソギシャワーAL

こんな場所に：駐車場／家まわり／庭・樹木まわり

そのまま使えるシャワー除草剤。お手持ちの散布
器に入れて使うエコパックがあります。

■農林水産省登録 第24081号
■成分：グリホサートイソプロピルアミン塩（アミノ酸系）
■容量と適用面積

2ℓ	20～100㎡（約 6～ 30坪）
5ℓ	50～250㎡（約 15～ 75坪）

〈エコパックタイプ〉

1.8ℓ	18～ 90㎡（約5.5～ 27坪）
7ℓ	70～350㎡（約 21～106坪）

7ℓはそのままかけるシャワーヘッド付

枯れ始め目安 2～7日後
雑草抑制期間 持続効果無し
※土壌条件、気象条件、使用量等によって差が生じます。

スギナ

茎葉処理型除草剤 液剤（微粒剤）のまき方

散布当日 天気が良く、風のない日に散布しましょう。
（散布後すぐに雨が降ると、薬剤が流されてしまい十分な効果が現れません）

液剤の場合



成分は葉や茎から吸収されるので、雑草全体にしっかり薬剤がかかるように散布する

微粒剤の場合



葉の上にも薬剤がつくようにまく

使用時期の目安 ※それぞれの商品ラベルの記載に従って散布します。



伸びた雑草に！雑草の生育期がまき時です！
（スポット散布にも使いやすい）

注意事項

- 風が強いと薬剤が飛散し、思わぬところの植物を枯らしてしまう場合があるので、十分注意してください。
- 成分は数時間で植物に移行します。
- 散布直後に散布場所を歩き回ると、薬剤が落ちてしまい効果にムラが出てしまうことがあるので、散布当日はその場所へ入らないようにしてください。
- 微粒剤は葉に薬剤が付着するよう、朝露で葉が濡れている早朝や雨上がりの散布が効果的です。

ホームページにも掲載しています。https://www.rainbow-f.co.jp

商品のお問い合わせは 03-6740-7777 レインボー薬品株式会社

あなたはどっち？

“信頼の黄” or “極みの黒”

あなたにぴったりの効き続ける※ネコソギシリーズ

※製品により約6～9ヶ月。ただし、土壌条件、気象条件、使用量、雑草の種類等により差が生じます。

ネコソギを使いたい雑草の状態は？

- 草が伸びている
  - **粒と液どっちを使いたい？**
    - 液を使いたい →

      ネコソギ ロングシャワーV8
    - 粒を使いたい →

      ネコソギ トップW
- 何も生えていない
  - **ネコソギを使いたい場所は？**
    - 駐車場や空き地など広い場所に →

      ネコソギ トップW
    - 家まわりなどの狭いところに →

      ネコソギ 粒剤

長期間効き続ける※ネコソギ

※土壌条件、気象条件、使用量、雑草の種類等により差が生じます。

	1ヶ月	2ヶ月	3ヶ月	4ヶ月	5ヶ月	6ヶ月	7ヶ月	8ヶ月	9ヶ月
粒	生える前～生え始め	ネコソギ史上最長! 最長9ヶ月効き続ける※							
液	伸びた雑草にも	最長8ヶ月効き続ける※							
粒	生える前～生え始め	約6ヶ月効き続ける※							

ネコソギ ロングシャワーV8

注意事項

- 植木等枯らしたくない植物の根が生えていると思われる場所には散布しないよう、十分注意してください。
- 傾斜地では使用しないでください。
- 効果にムラが出ないように、散布当日はその場所に入らないでください。

ホームページにも掲載しています。https://www.rainbow-f.co.jp

最適! 除草カレンダー

※駐車場、空き地など、植物を植えていない場所に限ります。

春

雑草が生えてくる春がスタート!!

つぶ 粒

「生やさない」ために、粒が効く!

3月～5月 伸びる前にまく!ネコソギ粒剤シリーズ

雑草が生える前や生え始めの雑草（20㎝以下）には土壌処理型の除草剤をおすすめします。

季節の除草POINT!

早くまいて予防

ネコソギで、雑草予防。
生える前～生え始めにまいて、しっかり除草。



雑草が生える前～草丈が低い時に（草丈20cm以下）まくと効果的です。

粒剤は水に溶かさず、土壌に落ちるように散布します。

※ネコソギエースV粒剤 30g/㎡散布時

夏

伸びた雑草、すばやく枯らして「生やさない」!

えき 液

枯らして生やさない※液のネコソギ

最長8ヶ月持続※

伸びた雑草に すばやく枯らして「生やさない」ネコソギロングシャワーV8

夏の雑草はぐんぐん伸びます。
すでに大きく育ってしまった雑草には、ネコソギロングシャワーV8!
すばやく枯らして、最長8ヶ月※生やさない!キレイが続く除草剤です。

季節の除草POINT!

根までしっかり枯らす

なかなか枯れないドクダミも根まで枯らすから、しっかり除草できます。

最長8ヶ月持続!※

すばやく枯らす

※土壌や気象条件、散布時期、使用量、草の種類などにより差が生じます。

秋・冬

雑草に油断は禁物!!

つぶ 粒

秋・冬にまいて「もう生やさない」!

最長9ヶ月持続※

雑草予防に しつこく生え続ける雑草に、秋・冬こそネコソギトップW粒剤

もうすぐ冬なのに…勢いはないものの雑草はひそかに伸び続けます。
そんな雑草にはネコソギトップWをパラパラまくだけで、
今年の除草はおしまいです!

季節の除草POINT!

除草効果の持続

除草効果が持続するから「生やさない」!
上手に使うことで、1年中キレイな状態を手に入れましょう。

ネコソギ トップW

※土壌や気象条件、散布時期、使用量、草の種類などにより差が生じます。



よくあるご質問

安全性について

除草剤は危険なのでは。

レインボー薬品の除草剤は全て普通物（毒物・劇物に該当しないものを指していう通称）です。植物特有の生理代謝（例:光合成）を阻害して雑草を枯らします。また、「枯れ葉剤」問題の原因であるダイオキシン類は含まれておりません。各種毒性試験を実施し、安全性を確認しています。

家の近くに井戸があるのですが、除草剤をまいても大丈夫ですか。

通常、除草剤の成分は地下水を汚染するほど浸透しません。それでも念のため、井戸から1m以上離して使用し、直接井戸の中に薬が入らないようにしてください。井戸から1m以内の場所では、草刈りをすることをおすすめします。

効果について

粒剤タイプの除草剤をまいたのですが、1週間たっても効果がありません。

「ネコソギ粒剤」や「ネコソギトップW粒剤」などの土壌処理型の除草剤は、効果が現れるまで日数がかかります。それは、成分がいったん土壌に移行してから雑草に吸収されるためで、効果が現れるまで早くても7～14日程度かかります。土壌が極端に乾燥している場合は成分が移行しにくいので、水をまいて土壌を湿らせてから薬剤を散布してください。すでに薬剤を散布してしまったあとに水をまく場合は、薬剤（粒）が流れてしまわないように、ジョロなどで静かに行ってください。

土壌が極端に乾燥している場合は効果が劣るので、降雨後に散布するか、ジョロ等で土壌を十分湿らせてから散布してください。



その他のよくある質問はWEBをご覧ください。

パソコンやスマートフォンから探せます!

質問から探せる!!

レインボー薬品ホームページ **https://www.rainbow-f.co.jp**

お気軽にご相談・お問い合わせください!

03-6740-7777

受付時間 月～金
午前9時00分～午後5時00分
土・日・祝日は除く

クスリを間違えて飲んだり食べたりしてしまったら! （公財）日本中毒情報センター 中毒110番

大　阪 **072-727-2499** 年中無休・24時間対応

つくば **029-852-9999** 年中無休・9時～21時対応

中毒110番は急性中毒に関する情報提供機関です。製品に関するご質問はレインボー薬品 03-6740-7777 平日9:00～17:00（土・日・祝休み）までお問い合わせください。

ホームページにも掲載しています。https://www.rainbow-f.co.jp

農薬を散布するときの注意

適用表の見方例

〈例〉希釈液剤の場合

適用作物・適用場所と使用方法

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	使用量 薬量	使用量 希釈水量	使用方法	総使用回数※ 本剤	総使用回数※ グリホサート	総使用回数※ ピラフルフェンエチル
果樹類（キウイフルーツ パイナップルを除く）	—	一年生及び多年生雑草	雑草生育期（草丈30cm以下 但し、収穫7日前まで）	0.4～0.6 mℓ/㎡	100 mℓ/㎡	雑草茎葉散布	3回	3回	3回
だいこん		一年生雑草	雑草生育期（草丈30cm以下）（耕起または、収穫7日前）				1回	1回	1回
キャベツ			雑草生育期（草丈30cm以下）（耕起または、収穫7日前）						
樹木等	公園、庭園、堤とう、道路、運動場、宅地、鉄道、のり面等	一年生及び多年生雑草	雑草生育期（草丈50cm以下）	0.5～1 mℓ/㎡		植栽地を除く樹木等の周辺地に雑草茎葉散布	3回	3回	3回
		スギナ	雑草生育期（草丈30cm以下）	1～2 mℓ/㎡					

※本剤及び本有効成分を含む農薬を、年間に同一場所に使用できる総使用回数の制限を示す。

希釈の方法は、薬量に対する水の量で記載されています。たとえば、このパッケージの薬剤を使って庭園に生えているスギナを枯らす場合は、**「水100mℓで薬液1～2mℓを希釈し1㎡に散布する」**という意味になります。これは倍率にすると50～100倍希釈になります。右記の図を参考にしてください。

表：薬量・希釈水量・倍率の関係

薬量	希釈水量	倍率
0.4mℓ	100mℓ	250倍
0.5mℓ		200倍
0.6mℓ		167倍
1mℓ		100倍
2mℓ		50倍



〈例〉粒剤の場合

適用雑草と使用方法

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	使用量	使用方法	総使用回数※ 本剤	総使用回数※ イソウロンシアナジン及びDBNを含む農薬
樹木等	公園、庭園、堤とう、道路、駐車場、運動場、宅地、墓地、鉄道等	一年生雑草 多年生広葉雑草 スギナ	雑草発生前	7.5～20 kg/10a	植栽地を除く樹木等の周辺地に全面土壌散布	本剤 3回以内	3回以内
			雑草生育初期（草丈20cm以下）	10～20 kg/10a			

※本剤及び本有効成分を含む農薬を、年間に同一場所に使用できる総使用回数の制限を示す。

除草剤の適用表では、使用量をkg／10aで記載する場合があり、これは「10aに何kgの薬剤を散布する」と言う意味です。10a=1,000㎡、1kg=1,000gですので「1㎡あたり何g散布」と読み替えることができます。

上記パッケージ例

「10aに対して10～20kgを散布」は、「1㎡に対して10～20gを散布」と読み替えられます。

代表的な面積の単位：1 a（アール）＝100㎡　1坪（つぼ）＝約3.3㎡　1反（たん）＝約300坪　1畳（じょう）＝ 0.5坪＝約1.65㎡

農薬のラベルには「効果・薬害などの注意」と「安全使用上の注意」を記載するように義務付けられています。そしてさらに注意を促すための注意喚起マークを絵表示で表しています。

農薬の取り扱い説明についている主な絵表示マーク

マスク着用	保護メガネ着用	不浸透性手袋着用	河川流出禁止（魚介類注意）	施設内使用禁止（ハウス内など噴霧のこもりやすい場所では使わない）

商品のお問い合わせは **03-6740-7777** レインボー薬品株式会社

雑草の写真と、対応薬剤の番号（❶〜⑲）をご確認ください。

※薬剤ごとに使用時期や方法は異なります。それぞれの製品ラベルを良く読み正しくお使いください。
※写真は生育期のものです。

土壌処理型除草剤

❶ネコソギ粒剤
❷ネコソギトップW粒剤

土壌処理型+茎葉処理型除草剤

❸ネコソギロングシャワーV8

茎葉処理型除草剤

❹ネコソギWクイック微粒剤
❺ネコソギクイックプロFL
❻ネコソギクイックプロシャワー
❼ネコソギガーデンシャワー
❽ネコソギシャワーAL

コケ駆除剤

❾コケレス
❿コケとーるスプレー
⓫コケとーるシャワー
⓬コケとーる業務用
⓭コケとーるしっかり原液

芝生専用除草剤

⓮シバキープエース液剤
⓯シバキープPro顆粒水和剤
⓰シバキープAL
⓱シバキープエースシャワー
⓲シバキープⅢ粒剤
⓳シバキーププラスV

よく見かける 雑草と対応薬剤

コケを枯らしたい

コケ駆除剤 ※農薬ではありません。

日陰や北側の玄関先、塀やレンガなどに。
コケ駆除剤をおすすめします。

※あらかじめ目立たない場所に散布し、変色等がでないことを確認のうえ使用します。

⑨コケレス

ゼニゴケをすばやく死滅させることができる非農耕地用の家庭用コケ専用駆除剤です。速効性でしかも土壌中に入ると炭酸ガスと水に分解され自然物になります。ゼニゴケだけでなく、コケ類全般に効果があります。

水に溶かして使う
頑固なコケにも効く
ゼニゴケ

枯れ始め目安 1〜3日後

■容量と適用面積

25g×2包	約3.3㎡（約1坪）

⑩コケとーるスプレー

しつこいコケに直接スプレーするだけで、すばやく除去するコケ駆除剤です。外壁、ブロック塀、ベランダ、テラス、駐車場、門柱などに発生したコケをスッキリ綺麗に除去します。

そのままかけるだけ
シャワータイプ
頑固なコケにも効く
ゼニゴケ

枯れ始め目安 1〜3日後
効果持続 約1ヶ月※

※ゼニゴケに対する効果

■容量と適用面積

500mℓ	5〜10㎡（約1.5〜3坪）

⑪コケとーるシャワー

しつこいコケに直接散布するだけで、すばやく除去するコケ駆除剤です。外壁、ブロック塀、ベランダ、テラス、駐車場、門柱などに発生したコケをスッキリ綺麗に除去します。

そのままかけるだけ
シャワータイプ
頑固なコケにも効く
ゼニゴケ

枯れ始め目安 1〜3日後
効果持続 約1ヶ月※

※ゼニゴケに対する効果

■容量と適用面積

1.2ℓ	12〜24㎡（約4〜 7坪）
2ℓ	20〜40㎡（約6〜12坪）

⑫コケとーる業務用

外壁、ブロック塀、ベランダ、玄関先、タイル、エクステリア等に発生したコケをすばやく除去します。約1ヶ月効果が持続します。使用場所に合わせて2way（塗布・散布器具）に対応できます（器具は付属していません）。大容量サイズで広い面積に使えます。

そのまま使える
頑固なコケにも効く
ゼニゴケ

枯れ始め目安 1〜3日後
効果持続 約1ヶ月※

※ゼニゴケに対する効果

■容量と適用面積

4ℓ	40〜80㎡（約12〜24坪）

⑬コケとーるしっかり原液

広い面積に使用できる原液タイプ。家まわり、スロープ、テラス、駐車場などに発生したコケをすばやく枯らします。しつこいゼニゴケもしっかり枯らします。食品添加物由来の成分を使用しています。

薄めて使う
頑固なコケにも効く
ゼニゴケ

枯れ始め目安 1〜3日後

■容量と適用面積

200mℓ	27〜53㎡（約8〜16坪）

問合せの多い “イシクラゲ”って？

舗装をしていない地面などに、雨が降ると“ワカメ”のようなモノが現れ、これを踏んで滑ってしまった経験のある人も多いと思いますが、この“ワカメ”のようなモノの正体は「イシクラゲ」という生物です（ネンジュモ・リクワカメとも言う）。国内では至る所で目にしますが、その生態はいまだ解明されておらず、謎に包まれた生物です。完全な駆除法はありませんが、「ネコソギロングシャワーV8」（P6）で個体数を減少させることができます。他には物理的に取り除くくらいしかありません。

ホームページにも掲載しています。https://www.rainbow-f.co.jp

困ったコケ対策

コケ駆除剤使用後の変化

コケ駆除剤・コケとーるシリーズ

を上手に使って、すっきりキレイに。

スロープとその壁面

※コケとーるスプレー使用例

コンクリートの通路

※コケとーるシャワー使用例

ウッドデッキ

※コケとーるしっかり原液使用例

流しまわりの壁面

※コケとーるスプレー使用例

裏庭

※コケとーるしっかり原液使用例

※あらかじめ目立たない場所に散布し、変色等がでないことを確認のうえ使用します。

お客様の声 ※モラタメ クチコミより

梅雨明けを待って早速、使ってみました。ずっと気になっていた苔が、きれいに落ちたのにはびっくりです。撒くだけできれいになったのが良かったです！（50代 女性）

簡単にコケが落とせて、気に入りました。シャワータイプは広範囲にまきやすくて便利ですね。（30代 男性）

今まで玄関のコンクリートが汚れていくのが気になっていました。早速試してみました。こんなによく落ちるとは思っていませんでした。とても嬉しかったです！（60代 女性）

お手入れ“3つの基本”キレイな芝生に

WEB公開中!! シバキープNAVI
詳しくは レインボー薬品 で検索!!

芝生のメンテナンスは おまかせ!!

1 刈り込み

芝の生育期に、生長の具合を見ながら刈り込みを行います。刈り高は3～5cm程度が一般的です。軸刈りすると芝生が枯れてしまうことがあるので注意が必要です。刈り込みを4月下旬～10月頃の間に、こまめに繰り返す(日本芝の場合1～2週間に1回)ことで、きれいな芝生になります。

芝生全体には芝刈り機

庭・花壇のフチなどにはバリカンが使いやすい

2 雑草防除

手で抜くと根が残ってしまう種類の雑草や、面積が広くて作業が大変な場合にはお助けアイテムの除草剤を活用しましょう。
※芝植えつけ後1年以内や根切り作業後3ヶ月以内のご使用はひかえてください。

手で抜くのは大変…

＼お助けアイテムの除草剤／

持続性のある粒剤タイプ
長期間、雑草を生やしたくない。

速効性のある液剤タイプ
すぐに雑草を枯らしたい。

3 環境整備

●水やり

夏場、乾燥しすぎると枯れてしまうことがあります。特に芝を張った当初は乾燥に注意が必要です。水やりをするときは、芝生全体にまんべんなくたっぷりと行います。

水やり

●施肥

きれいな芝生を育てるためには肥料もかかせません。芝生の生育状況に合わせて適宜肥料を与えましょう。

シバキープシャワー液肥散布

●サッチ出し

サッチ:刈りカスや枯れ葉などの茎葉が密に混じった堆積層のこと。サッチがたまると芝生が蒸れたり、虫や病気発生の原因になったりとよいことはないので、芝刈り後に熊手やレーキなどでかき出します。サッチを微生物の力で分解する「シバキーププロ芝生のサッチ分解剤」の使用もおすすめです。

●目土入れ

目土とは清潔で細かい砂状の土のことです。主に芝生の低くなっている部分や、生長が悪く禿げている箇所にふるいを使って薄くまいてやります。目土の量は葉が少し出る程度です(厚さ約5㎜)。こうすることで、芝生面の凸凹がなくなり、芝刈りの管理がやりやすくなるとともに、芝が若返り美しい緑を保つことができます。

目土は芝生の葉が見える程度に入れる。

●エアレーション

芝生が張られて数年経つと、土が固くなってきて芝の呼吸や生長を妨げるようになります。そこで芝に穴を開けて通気性を高め、そこへ目土を入れることで更新を図ります。作業時期は生育旺盛な春と秋が適期です。芝生が弱る高温期や、生長しない冬期は作業をさけましょう。

●害虫駆除

芝生は一部の昆虫にとって産卵に適した環境です。ふ化した幼虫が芝生の根などを食害するので、発生時期に合わせ予防的に殺虫剤を散布しましょう。

芝生専用除草剤のまき方

※土壌条件、気象条件、使用量、雑草の種類などにより差が生じます。
※各製品パッケージをよくお読みになりご使用ください。

粒剤タイプ

雑草が生える前から小さいうちに全面散布します。効果はゆっくり長く(約4ヶ月)※持続します。
※商品により異なります。

芝植えつけ後1年以内や根切り作業後
3ヶ月以内は使用しないでください。

※シバキーププラスV 40g/㎡散布時

液剤タイプ

葉や茎から浸透するので、薬液がしっかりと枯らしたい雑草にかかるようにしてください。

低温期は効果が出るまでに時間がかかります。
特にシバキープALは日中の気温が
18℃以上になった時期にご使用ください。

※シバキープエースシャワー 100㎖/㎡散布時

使用時期の目安

	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
芝生の状態	休眠期				生育期						休眠期	
				病害虫注意期				高温注意期				
芝生のメンテナンス			除草剤使用時期							除草剤使用時期		
					刈り込み・サッチ出し							
				目土入れ								
					水やり・施肥							
					殺虫剤使用時期							

※関東の日本芝基準(天候により差が生じる場合があります)

ホームページにも掲載しています。https://www.rainbow-f.co.jp/shibakeep
商品のお問い合わせは 03-6740-7777 レインボー薬品株式会社

キレイな芝生にしたい　芝生資材・肥料

着色ウッドチップ材

シバキープグリーンカバー

芝張り後の目地や、はげてしまった部分に
サラサラまくだけ。芝の回復を促す肥料入り。

約1～2ヶ月の化粧効果

パラパラまくだけ　日本芝 西洋芝 対応

サッチ分解剤

シバキーププロ芝生のサッチ分解剤

※除草剤ではありません。

納豆菌の仲間であるバチルス菌を配合。パラパラまくだけで、サッチ（芝生の刈りカスや枯れ葉などの茎葉が密に混じった堆積層）を分解し、健全な芝生の育成をお手伝いします。

■容量と適用面積

1.5kg	37.5㎡（約11坪）
2.8kg	70㎡（約21坪）

機能性有機肥料　日本芝 西洋芝 対応　パラパラまくだけ

液体肥料

シバキープシャワー液肥

芝生を色鮮やかに育てるには栄養が必要。薄める手間なく、そのままま け、葉からも根からも効きます。

■容量と適用面積

2ℓ	10～20㎡（約3～　6坪）
5ℓ	25～50㎡（約7.5～15坪）

そのままかけるだけ　シャワータイプ　日本芝 西洋芝 対応

芝生を傷めずに雑草を枯らしたい　芝生専用除草剤

⑭シバキープエース液剤

広い面積に散布したいときに。
簡単計量キャップ付で量りやすい。
抜き取りづらいクローバーや
カタバミにも効果。
※高温時の薬害に注意。

■農林水産省登録 第23827号
■成分:アシュラム（酸アミド系）、
MCPP（フェノキシ酸系）
■容量と適用面積

200㎖	100～200㎡（約30～ 60坪）※
400㎖	200～400㎡（約60～120坪）※

※日本芝使用時

薄めて使う　枯れ始め目安 3～7日後　雑草抑制期間 持続効果無し
※土壌条件、気象条件、使用量等によって差が生じます。

頑固な雑草にも効く　日本芝 専用

こんな雑草に効く
・一年生イネ科雑草 ・広葉雑草
・スギナ

詳細はP14～15へ

⑮シバキープPro顆粒水和剤

西洋芝にも対応!

日本芝（こうらいしば）と西洋芝（ケンタッキーブルーグラス、ベントグラス、バーミューダグラス）の中に生える雑草を枯らします。

■農林水産省登録 第23251号
■成分:フルセトスルフロン
（スルホニルウレア系）
■容量と適用面積

2.4g*	20㎡（約6坪）×2回

*2.4g（1.2g×2包）

水に溶かして使う　枯れ始め目安 7～14日後　雑草抑制期間 約3ヶ月※
※土壌条件、気象条件、使用量等によって差が生じます。

日本芝 西洋芝 対応

こんな雑草に効く
・一年生イネ科雑草 ・広葉雑草
・ヒメクグ ・ハマスゲ

詳細はP14～15へ

芝生専用

芝生専用

使用時期の目安

※真夏の高温時には使用しないでください。

まき方：P19をご覧ください。

	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
⑬シバキープⅢ粒剤			シーズン中2～3回、散布することをお勧めします。									
⑬シバキーププラスV			シーズン中2～3回、散布することをお勧めします。									
⑱シバキープ AL					スポット散布				スポット散布			
⑰シバキープエースシャワー					スポット散布				スポット散布			
⑭シバキープエース液剤					スポット散布				スポット散布			
⑮シバキープ Pro 顆粒水和剤			シーズン中2～3回、散布することをお勧めします。									

日本芝と西洋芝の違いとは?

芝にはいろいろな種類がありますが、大きく日本芝と西洋芝に分けることができます。園芸店やホームセンターで切り芝の状態で販売されていることが多いのは、日本芝です。芝生用の除草剤を選ぶときに、育てている芝が日本芝であるか西洋芝であるかを知っておく必要があります。

	日本芝 ・コウライシバ ・ヒメコウライシバ ・ノシバ	西洋芝 ・ブルーグラス類 ・ベントグラス類 ・ライグラス類
地上部の冬の状態	枯れる（春になると芽が出る多年草）	枯れない（バーミューダグラスを除く）
作り方	はり芝	種をまく（一部を除く）
芝刈りの回数	〈例〉7月／週1回程度	〈例〉7月／3～4日に1回程度

ホームページにも掲載しています。https://www.rainbow-f.co.jp/shibakeep

商品のお問い合わせは　03-6740-7777　レインボー薬品株式会社

芝生を傷めずに雑草を枯らしたい

芝生専用除草剤

緑鮮やかな芝生に雑草が生えていては、美しさも清々しさも台無しです。
芝生を傷めずに雑草を枯らすためには、必ず芝生用の除草剤を選び、使用量・使用方法を守ってお使いください。
また、芝生のお手入れには「芝生資材・肥料」(P20掲載)がおすすめです!

⑯シバキープAL

日本芝(コウライシバ)と
ケンタッキーブルーグラスの中に
生える雑草を枯らします。
※気温18℃以上でないと
効果がありません。

■農林水産省登録 第21148号
■成分:MCPP(フェノキシ酸系)
■容量と適用面積

2ℓ	10～ 26㎡(約 3～ 8坪)
5ℓ	25～ 66㎡(約7.5～20坪)
〈スタンドパック〉	
1.8ℓ	9～ 24㎡(約2.7～ 7坪)

枯れ始め目安 3～7日後
雑草抑制期間 持続効果無し
※土壌条件、気象条件、使用量等によって差が生じます。

そのままかけるだけ
日本芝 ケンタッキーブルーグラス対応
スギナ

こんな雑草に効く
・一年生広葉雑草 ・スギナ
※イネ科雑草には効果なし

詳細はP14～15へ

⑰シバキープエースシャワー

芝生の中によく生える一年生イネ科雑草にも
効果がある芝生用シャワー除草剤。
※高温時の薬害に注意。

■農林水産省登録 第23502号
■成分:アシュラム(酸アミド系)、
MCPP(フェノキシ酸系)
■容量と適用面積

900mℓ	4.5～ 9㎡(約1.4～2.7坪)
3ℓ	15～ 30㎡(約4.5～ 9坪)

枯れ始め目安 3～7日後
雑草抑制期間 持続効果無し
※土壌条件、気象条件、使用量等によって差が生じます。

頑固な雑草にも効く
そのままかけるだけ
日本芝専用

こんな雑草に効く
・一年生イネ科雑草 ・広葉雑草
・スギナ

詳細はP14～15へ

⑱シバキープⅢ粒剤 NEW

芝生の中に生えた雑草を枯らします。

■農林水産省登録 第24296号
■成分:メコプロップPカリウム塩(フェノキシ酸系)、
DBN(ニトリル系)

■容量と適用面積

900g	22.5～ 45㎡(約 7～13坪)
3kg	75～150㎡(約 23～45坪)

枯れ始め目安 7～14日後
雑草抑制期間 約4ヶ月※
※土壌条件、気象条件、使用量等によって差が生じます。

3kgは散布器&手袋付
パラパラまくだけ
日本芝 観賞用ジャノヒゲ対応

こんな雑草に効く
・一年生イネ科雑草、
キク科をはじめとする広葉雑草
・スギナ

詳細はP14～15へ

⑲シバキーププラスV NEW

肥料成分がプラスされ芝生の生育をやさしく
促しながら、雑草は根までしっかり枯らします。

■農林水産省登録 第24427号
■成分:メコプロップPカリウム塩(フェノキシ酸系)、
DBN(ニトリル系)
■容量と適用面積

1kg	25～ 50㎡(約7.5～15坪)
2kg	50～100㎡(約 15～30坪)
4kg	100～200㎡(約 30～60坪)

枯れ始め目安 7～14日後
雑草抑制期間 約4ヶ月※
※土壌条件、気象条件、使用量等によって差が生じます。

肥料入り
パラパラまくだけ
日本芝 観賞用ジャノヒゲ対応

こんな雑草に効く
・一年生イネ科雑草、
キク科をはじめとする広葉雑草
・スギナ

詳細はP14～15へ

芝生専用

芝生専用

問合せの多い 「シバキープⅢ粒剤」など、粒剤タイプの除草剤を撒いた後にペットを放しても大丈夫

大丈夫です。家庭用の除草剤は、植物特有の生理代謝を阻害して草を枯らすので、
人間をはじめとする動物には安全性が高いといえます。
ただし、せっかく薬剤を均一に撒いても、犬や人間が歩き回ることで薬剤が散ってしまい、
効果にムラが出る原因となるので、散布した当日はその場所に入らないようにしてください。

▶よく見かける雑草と対応薬剤

※写真は生育期のものです

これは抜粋です。詳細はP14～15へ

ホームページにも掲載しています。https://www.rainbow-f.co.jp/shibakeep

商品のお問い合わせは 03-6740-7777 レインボー薬品株式会社