

# 芝用殺菌剤

緑化用

# ベンレート®

水和剤

## 予防と治療

2つの効果で  
芝生を守る



住化グリーン株式会社

# 芝用殺菌剤

緑化用

# ベノレート®

水和剤

農林水産省登録 第21705号

成分: ベノミル 50.0%

性状: 類白色水和性粉末45μm以下

毒性: 普通物(毒劇物に該当しないものを指している通称)

包装: 500g×10袋

## 特長

### ① 幅広い適用・殺菌スペクトラム

ダラースポット・ブラウンパッチ・炭疽病・カーブラリア葉枯病・  
紅色雪腐病に優れた効果を示します。

### ② 浸透移行性に優れ予防と治療効果を発揮

### ③ 安定した残効性

ベノミルが徐々に活性成分に変化するため長期間効果が持続します。

## ■適用病害と使用方法

作物名	適用病害名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ベノミルを含む農薬の総使用回数
西洋芝(ベントグラス)	葉腐病 (ブラウンパッチ)	2000~3000倍	2ℓ/m <sup>2</sup>	発病初期	6回以内	散布	6回以内
		1000~2000倍	0.5ℓ/m <sup>2</sup>				
	ダラースポット病	1000~3000倍	0.5ℓ/m <sup>2</sup>				
		400倍	0.2ℓ/m <sup>2</sup>				
炭疽病	1000~2000倍	0.5ℓ/m <sup>2</sup>					
西洋芝(ケンタッキーブルーグラス)	紅色雪腐病	1000倍	0.5ℓ/m <sup>2</sup>	移植前	1回	30分間 根部浸漬	
西洋芝(ベレニアルライグラス)							
日本芝(こうらいしば)	カーブラリア葉枯病	400~800倍	0.2ℓ/m <sup>2</sup>				
樹木類	オオハリセンチュウ	500倍	—				

### ⚠ 効果・薬害等の注意

- 使用量に合わせ薬液を調製し、使いきってください。
- 本剤および同系統の薬剤の連続使用によって薬剤耐性菌が出現し、効果が劣った例があるので過度の連用をさけ、なるべく作用性の異なる薬剤を組み合わせ使用してください。
- エトフェンブロックス乳剤またはダイアジノン乳剤と混用した場合、凝固物を生成するため混用をさけてください。
- 適用作物群に属する作物またはその新品種に本剤をはじめて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用してください。なお病害虫防除所等関係機関の指導を受けることをおすすめします。

### ⚠ 安全使用上の注意

- 眼に対して弱い刺激性があるので眼に入らないように注意してください。万一眼に入った場合には直ちに水洗してください。
- 皮膚に対して弱い刺激性があるので皮膚に付着しないように注意してください。万一付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落としとしてください。
- 使用に際しては、農業用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。また薬剤を吸い込んだり、浴びたりしないように注意し、作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをし、衣服を交換してください。
- 作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯してください。

●使用前にはラベルをよく読んでください。●ラベルの記載以外には使用しないでください。●小児の手の届く所には置かないでください。●使用後の空袋等は圃場などに放置せず、適切に処理してください。

SCC GROUP  
住友化学 アグログループ



住化グリーン株式会社

〒103-0016 東京都中央区日本橋小網町1番8号  
TEL.(03)6837-9422 FAX.(03)6837-9423  
http://www.sumika-green.jp