

除草剤
ロンセイバー
イマゾスルフロン水和剤

平成 27 年 4 月 22 日付けで以下の適用拡大が登録されました。

(追加事項)

- ・ 適用雑草に「メヒシバ」及び「コケ類」を追加する。

作物名	適用雑草名	使用時期	使用量		本剤の使用回数	使用方法	イマゾスルフロンを含む農薬の総使用回数
			薬量	希釈水量			
日本芝 (こうらいしば)	メヒシバ	春夏期芝生育期 (メヒシバ発生前)	0.1～ 0.2 g/m ²	200～ 300 ml/m ²	2 回以内	全面土壌散布	3 回以内
	コケ類	春夏期芝生育期 (雑草発生初期)				雑草茎葉散布 又は 全面土壌散布	

(変更事項)

- ・ 使用時期「春夏期雑草発生初期(芝生育期)」を「春夏期芝生育期(雑草発生初期)」に、「雑草発生前～発生初期(芝生育期)」を「芝生育期(雑草発生前～発生初期)」に、「春夏期雑草発生前～発生初期(芝生育期)」を「春夏期芝生育期(雑草発生前～発生初期)」に、それぞれ変更する。
- ・ 使用方法「雑草茎葉散布兼全面土壌散布」を「雑草茎葉散布又は全面土壌散布」に変更する。

【変更後】

作物名	適用雑草名	使用時期	使用量		本剤の使用回数	使用方法	イマゾスルフロンを含む農薬の総使用回数
			薬量	希釈水量			
日本芝 (こうらいしば)	メヒシバ	春夏期芝生育期 (メヒシバ発生前)	0.1～ 0.2 g/m ²	200～ 300 ml/m ²	2 回以内	全面土壌散布	3 回以内
	コケ類	春夏期芝生育期 (雑草発生初期)				雑草茎葉散布 又は 全面土壌散布	
日本芝	ヒメクグ						
	西洋芝 (ベントグラス)	一年生及び 多年生広葉雑草				春夏期芝生育期 (雑草発生前 ～発生初期)	

使用上の注意事項などについては、製品に添付されているラベルを参照のこと。

住化グリーン株式会社