



〔クロチアニン水和剤〕 ヤシマ モリエートマイクロカプセル 有効成分：クロチアニン…7.5%	登録番号	第 22392 号
	性状	類白色水和性粘稠懸濁液体
	魚毒性	A 類相当
	危険物	—
	有効年限	3 年
	包装	6.7ℓ×2

- ◎特長
1. 優れた後食防止効果
 2. 原体・製剤ともに普通物・魚毒性A類相当
 3. マイクロカプセル製剤
 4. 臭いが少ない低臭性
 5. 長い残効性

◎使用方法

作物名	適用害虫名	希釈倍数	散布液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	クロチアニンを含む農薬の総使用回数
ま っ (生立木)	マツノマダラカミキリ成虫	100～ 200 倍	3ℓ/本 (樹高 10m)	成虫の発生初期	4 回以内	散 布	4 回以内

◎注意事項

- 使用前にはよく振って使用すること。
- 激しい降雨の予想される場合は使用をさけること(効果)。
- 本剤によるマツノマダラカミキリ成虫防除は後食防止を目的とするものであり、成虫の発生初期に時期を失ないように散布する。
- 散布薬量は、樹高 10m のまつ 1 本あたり 3ℓを基準とし、木の大きさにより適宜増減し、樹冠部を中心に全面散布する(効果)。
- 使用量、使用時期、使用方法を守る。特に初めて使用する場合は、病虫害防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。
- 使用量に合わせ薬液を調整し、使いきる。空容器は圃場などに放置せず、3 回以上水洗し適切に処理する。洗浄水はタンクに入れる。
- 桑にかからないように注意(蚕毒)。
- ミツバチに対する注意
 - ミツバチの巣箱及びその周辺に飛散する恐れがある場合には使用しない。
 - 養蜂地区では周辺への飛散に注意し危害防止に努める。
- 散布器具、容器の洗浄水は河川等には流さず、空容器等は環境に影響を与えないよう適切に処理すること。
- 街路、公園等で使用する場合は、散布中及び散布後(少なくとも散布当日)に小児や散布に関係のない者が散布区域に立ち入らないよう縄囲いや立て札を立てるなど配慮し、人畜等に被害を及ぼさないよう注意を払うこと。

保管：密栓し、直射日光をさけ、食品と区別して、冷涼な所へ保管する。