


【商品情報】

カテゴリー	伐倒駆除剤／くん蒸剤	
商品名	ヤシマNCS	
有効成分	カーバム（PRTR・1種） 50.0%	
規格	10×10	

【特長】

- 処理方法が簡便
 - ・被害材の上部に、本剤を原液のまま容器から直接散液し、一定期間生分解性シート等で被覆するだけです。くん蒸の際には「くん蒸与作シート」（生分解性シート）がお勧めです。
- 防除効果が高い
 - ・マツノマダラカミキリの樹皮下幼虫はもちろん、材部深く穿孔した老熟幼虫やマツノザイセンチュウに対して顕著な効果を発揮します。
- 低温時でも有効
 - ・本剤は、低温などの気温に関係なく容易にガス化し、被害材のすみずみまで浸透します。

【登録情報】

分類	登録番号	種類	名称	有効期限
農薬	第19249号	カーバム剤	ヤシマNCS	2年

【適用表】

作物名	適用場所	適用病害虫名	使用量	くん蒸時間	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	カーバムを含む農薬の総使用回数
まつ (伐倒木)	貯木場 林内空地	マツノマダラカミキリ幼虫 マツノザイセンチュウ	被覆内容積1㎡当り 原液0.5ℓ	14日以上	—	1回	加害された伐倒木を配置し本剤を散布し、直ちにビニール等で密閉し、くん蒸する。	1回
			被覆内容積1㎡当り 原液1.0ℓ	7日以上				
いぬまき (伐倒木)		ケブカトラカミキリ	被覆内容積1㎡当り 原液0.5ℓ	14日以上				
			被覆内容積1㎡当り 原液1.0ℓ	7日以上				
すぎ (伐倒木)		スギカミキリ	被覆内容積1㎡当り 原液0.5ℓ～1.0ℓ					
かし (枯損木) なら (枯損木) しいのき (枯損木)		林地	カシガキカミキリ	被覆内容積1㎡当り 原液1.0ℓ				
	1樹当り {胸高直径(cm)} × {原液12～18mℓ}			千鳥状に開けた穴に規定量の原液を注入し、くん蒸する。				

(2018年12月20日 現在)