

# ディアマンテ<sup>®</sup>

農林水産省登録 第23742号

水和剤

トルクロホスメチル・マンデストロビン水和剤

Golf Course



ディアマンテ処理区

無処理区

ダラースポット病治療自社試験 処理17日後  
(2016年5月26日散布、6月12日調査)

ダラースポット病に卓効!  
炭疽病やブラウンパッチにも

異なる作用の2成分配合!  
安定した効果を発揮

持続効果が長い!  
(委託試験・自社試験の結果から)

治療効果も発揮!  
病害発生初期の散布が可能

芝生用  
殺  
草  
劑



Rainbo Pharmaceuticals Co., Ltd.

2つの有効成分が安定した効果を發揮！

# ディアマンテ 水和剤

®

農林水産省登録 第23742号  
成分：トルクロホスメチル 40.0%  
マンデストロビン 10.0%  
性状：類白色水和性粘稠懸濁液体  
毒性：普通物（毒劇物に該当しないものを指している通称）  
包装：500ml×10本

## 特長

1

2つの有効成分が  
安定した効果を發揮

※作用性が異なる  
トルクロホスメチルと  
マンデストロビン

2

ローテーションの  
偏りを減らし、  
耐性菌の  
発達を防ぐ！

3

ダラースポット病に  
卓効を示す他  
炭疽病やブラウンパッチ、  
フェアリーリング病にも  
効果あり！

## 適用病害と使用方法

（2019年7月現在の登録内容）

作物名	適用病害名	使用量		使用時期	使用方法	総使用回数※	
		薬量	希釈水量			本剤及び トルクロホスメチル を含む農薬	マンデストロビン を含む農薬
日本芝	カーブラリア葉枯病						
西洋芝 (ペントグラス)	葉腐病 (ブラウンパッチ)	0.5ml/m <sup>2</sup>	0.5ℓ/m <sup>2</sup>	発病初期	散布	5回以内	8回以内
	炭疽病		0.05~0.5ℓ/m <sup>2</sup>				
	ダラースポット病		1.0ℓ/m <sup>2</sup>				

※は本剤及びそれぞれの有効成分を含む農薬の総使用回数の制限を示す。

## △ 効果・薬害等の注意

- 使用前に容器をよく振ってください（沈殿）
- 散布液調製後は速やかに使用してください（分解）
- 使用量、使用時期、使用方法を守ってください。特に初めて使用する場合は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましいです。

## △ 安全使用上の注意

- 皮ふに付着しないように注意してください。皮ふに付いた場合は直ちに石けんでよく洗い落としてください。（弱い刺激性）
- 公園などで使用する場合、散布区域に縄囲いや立て札をたて、散布中および散布後（最小限その当日）に関係者以外は立ち入らせないでください。小児、人畜等に留意してください。

保 管…密栓し、直射日光をさけ、食品と区別して、冷涼な所。

■使用前にはラベルをよく読んでください。■ラベルの記載以外には使用しないでください。■小児の手の届く所には置かないでください。■空容器は圃場などに放置せず適切に処理してください。

