

芝生用殺菌剤

緑化用

ベンレート®
水和剤

ベンレートは住友化学(株)の登録商標

予防と治療

2つの効果で芝生を守る



ダラースポット病



ブラウンパッチ



紅色雪腐病



2つの効果で芝生を守る

緑化用

水和剤

ベノレート®

農林水産省登録 第21705号
成分:ベノミル(PRTR・1種).....50.0%
[メチル-1-(ブチルカルバモイル)-2-ベンゾイミダゾールカーバメート]
糖類、界面活性剤等.....50.0%
[メチル=ベンゾイミダゾール-2-イルカルバマート(PRTR・2種)1.1%以下]
性状:類白色水和性粉末45μm以下
毒性:普通物(毒劇物に該当しないものを指していう通称)
包装:500g×10袋
指定可燃物

特長

① 幅広い適用・
殺菌スペクトラム

ダラースポット病・ブラウンパッチ・炭疽病・
カーブラリア葉枯病・紅色雪腐病 に優れた効果を示します

② 浸透移行性に優れ
予防と治療効果を発揮

③ 安定した残効性

ベノミルが徐々に活性成分に変化するため
長期間効果が持続します

適用病害と使用方法

(2021年8月現在の登録内容)

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	ベノミルを含む 農薬の総使用回数
西洋芝 (ベントグラス)	葉腐病 (ブラウンパッチ)	2000~3000倍	2ℓ/㎡	発病初期	6回以内	散布	6回以内
		1000~2000倍	0.5ℓ/㎡				
	ダラースポット病	1000~3000倍	0.2ℓ/㎡				
		400倍	0.2ℓ/㎡				
西洋芝 (ケンタッキーブルーグラス) 西洋芝 (ペレニアルライグラス)	炭疽病	1000~2000倍	0.5ℓ/㎡				
	紅色雪腐病	1000倍					
日本芝(こうらいしば)	カーブラリア葉枯病	400~800倍	0.2ℓ/㎡	移植前	1回	30分間 根部浸漬 株元灌注	
樹木類(いぬつげを除く)	オオハリセンチュウ	500倍	—				
いぬつげ			10ℓ/㎡	—			

効果・薬害等の注意

- 使用量に合わせ薬液を調製し、使いきる。
- 本剤及び同系統の薬剤の連続使用によって薬剤耐性菌が出現し、効果の劣った例があるので過度の連用をさけ、なるべく作用性の異なる薬剤を組合せて使用する。
- 本剤はエトフェンプロックス乳剤またはダイアジノン乳剤と混用した場合、凝固物を生成するため混用をさける。
- 株元灌注を行う場合は、薬液を灌注した後、100ℓ/㎡灌水を行う。
- 本剤を初めて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用する。なお、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。

安全使用上の注意

- 本剤は眼に対して弱い刺激性があるので眼に入らないよう注意する。眼に入った場合は直ちに水洗する。
- 本剤は皮膚に対して弱い刺激性があるので皮膚に付着しないよう注意する。付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落とす。
- 使用の際は農業用マスク、不浸透性手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用する。作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをするとともに衣服を交換する。
- 作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯する。

- かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意する。
- 公園等で使用する場合は、使用中及び使用後(少なくとも使用当日)に小児や使用に関係のない者が使用区域に立ち入らないよう、縄囲いや立て札をたてるなど配慮し、人畜等に被害を及ぼさないよう注意を払う。
- 火災時は、適切な保護具を着用し、水・消火剤で消火に努める。
- 漏出時は、保護具を着用し掃き取り回収する。
- 移送取扱いは、ていねいに行う。

魚毒性等… ●水産動植物(魚類・甲殻類)に影響を及ぼすおそれがあるので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用する。

●使用残りの薬液が生じないように調製を行い、使いきる。散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さない。

また、空袋は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理する。

保管… 食品と区別して、直射日光をさけ、なるべく低温で乾燥した場所に密封して保管する。

■使用前にはラベルをよく読んでください。■ラベルの記載以外には使用しないでください。■小児の手の届く所には置かないでください。■空袋は圃場などに放置せず適切に処理してください。

SCC GROUP
住友化学 アグログループ



レインボー薬品株式会社

東京都台東区上野1-19-10
TEL.(03)6740-7777 FAX.(03)6740-7000