

グランサー®水和剤

トルクロホスメチル水和剤

グランサーは住友化学(株)の登録商標


Golf Course

雪腐病の基幹剤

長い残効性

葉腐病(ラージパッチ)、
疑似葉腐病(春はげ症)
にも

芝生用
殺菌剤



無処理区



グランサー水和剤 処理区

グランサー 200倍/200mℓ/m² (薬量1g/m²) 処理



レインボー薬品株式会社

雪腐病の基幹剤

グランサー水和剤

農林水産省登録 第15761号
有効成分:トルクロホスメチル 75.0%
性状:類白色水和性粉末63μm以下
毒性:普通物(毒劇物に該当しないものを指している通称)
包装:1kg×10袋

適用病害と使用方法


(2019年8月現在の登録内容)

作物名	適用病害名	希釈倍数	使用時期	使用方法	総使用回数※
芝 (日本芝)	葉腐病(ラージパッチ)	200倍	発病初期	1㎡当り0.2ℓ散布	本剤及び トルクロホスメチル を含む農薬
		500倍		1㎡当り0.5ℓ散布	
		500～1000倍		1㎡当り1ℓ散布	
	疑似葉腐病(春はげ症)	休眠期前及び萌芽前			
	疑似葉腐病(象の足跡)		発病初期		
芝 (ベントグラス)	雪腐小粒菌核病	200倍	根雪前	1㎡当り0.2ℓ散布	5回以内
		500～750倍		1㎡当り0.5～1ℓ散布	
	疑似葉腐病(イエローパッチ)	1000倍	秋～春期	1㎡当り1ℓ散布	

※は本剤及びその有効成分を含む農薬の総使用回数の制限を示す。

雪腐小粒菌核病に対する効果

平成17年 日植防委託試験成績より抜粋



- 草種:ケンタッキーブルーグラス
- 発生状況:多発生
- 区制・面積:1区6㎡(2m×3m)、3反復
- 散布:11月25日、各薬剤の所定量をジョロで散布
- 調査:平成18年4月21日、各処理区の発病面積率を調査

■発病面積率
■防除率

上手な使い方

雪腐小粒菌核病には
必ず根雪前に1～2回
散布してください



効果・薬害等の注意

- ・展着剤を使用してください。
- ・日本芝の葉腐病(ラージパッチ)に使用する場合は注意
 - ①常発地では予防散布に重点を置いた散布をしてください(効果)
 - ②1㎡当たり0.2～0.5ℓを散布する場合は、散布むらのないよう特に注意してください。
 - ③乾燥条件では0.5～1ℓを散布することが望ましいです。
- ・低温期散布(秋～春期散布)以外では、西洋芝に薬害を生じるおそれがあるので、付近にある場合にはかからないように注意してください(薬害)
- ・ベントグラスに使用する場合は注意
 - ①雪腐小粒菌核病には、500～750倍を1㎡あたり0.5～1ℓ、薬量として1～1.3gを、200倍を1㎡あたり0.2ℓ、薬量として1gを、なるべく根雪前の晴天の日に散布してください。
 - ②疑似葉腐病(イエローパッチ)に使用する場合は、発病前から予防的に散布してください。また、なるべく晴天の日に散布し、散布液が芝の葉上で氷結することのないよう注意してください。
- ・飼料作物に使用しないでください。

安全使用上の注意

公園などで使用する場合、散布区域に縄囲いや立て札をたて、散布中および散布後(最小限その当日)に関係者以外は立ち入らせないでください。小児、人畜等に留意してください。

保管…密封し、直射日光をさけ、食品と区別して、冷蔵・乾燥した所。

■使用前にはラベルをよく読んでください。■ラベルの記載以外には使用しないでください。■小児の手の届く所には置かないでください。■空袋は園場などに放置せず適切に処理してください。

SCC GROUP
住友化学 アグログループ



レインボー薬品株式会社

東京都台東区上野1-19-10
TEL. (03) 6740-7777 FAX. (03) 6740-7000