

リゾトップはレインボー薬品(株)の登録商標

芝用殺菌剤

リゾトップ®

農林水産省登録第22982号
 成分：フラメトピル 50.0%
 補助成分：ドデシル硫酸ナトリウム(PRTR・1種) 4.0%
 性状：類白色水和性細粒
 毒性：普通物
 (毒劇物に該当しないものを指している通称)
 包装：500g×4袋

特 長

優れた予防・
治療効果があります。


長い残効性で、
長期間病害の
発生を抑えます。

高い吸収移行性で、
耐雨性に優れます。


適用病害と使用方法

作物名	適用病害名	使用量		使用時期	本剤の使用回数	使用方法	フラメトピルを含む農薬の総使用回数
		薬量	希釈水量				
日本芝	葉腐病 (ラージパッチ)	0.15g/m ²	0.2~0.3ℓ/m ²	発病初期	2回以内	散布	2回以内
	疑似葉腐病 (春はげ症)	0.1g/m ²	0.1~0.3ℓ/m ²	休眠期前			

使用適期



ラージパッチへの効果



△ 効果・薬害等の注意

- 使用量に合わせ薬液を調整し、使いきってください。
- 使用量、使用時期、使用方法を守ってください。特に初めて使用する場合は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましいです。

△ 安全使用上の注意

- 誤飲、誤食に注意してください。誤って飲み込んだ場合は吐き出させ、直ちに医師の手当を受けさせてください。使用中に異常を感じた時は、直ちに医師の手当を受けてください。
 - 眼に入らないように注意してください。眼に入った場合は直ちに水洗し、眼科医の手当を受けてください。(刺激性)
 - 皮膚に付着しないように注意してください。皮膚に付いた場合は直ちに石けんでよく洗い落としてください。(刺激性)
 - 散布時は農薬用マスク、手袋、長ズボン・長袖作業衣などを着用してください。作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをして洗眼してください。
 - かぶれやすい人は取扱いに十分注意してください。
 - 公園などで使用する場合、散布区域に縄囲いや立て札をたて、散布中および散布後(最小限その当日)に関係者以外は立ち入らせないでください。小児、人畜等に留意してください。
- 保管：密封し、直射日光を避け、食品と区別して、冷蔵・乾燥した所に保管してください。
- 空袋は圃場などに放置せず適切に処理してください。
 - 有効年月内に使用してください。
 - 体調の悪いとき、妊娠中、飲酒後等は取扱いおよび作業をしないでください。
 - 飲めません。食べられません。
 - 火災時は、適切な保護具を着用し、水・消火剤等で消火に努めてください。
 - 漏出時は、保護具を着用し掃き取り回収してください。
 - 移送取扱いはていねいに行ってください。

●使用前にはラベルをよく読んでください。 ●ラベルの記載以外には使用しないでください。 ●小児の手の届くところには置かないでください。

SCC GROUP
 住友化学 アグログループ



レインボー薬品株式会社

東京都台東区上野1-19-10
 TEL. (03) 6740-7777 FAX. (03) 6740-7000