

農林水産省登録 第18347号

エンバー MC[®]


ペルメトリンマイクロカプセル剤

Golf Course

500mL
入



芝の病害防除は
長く効く液剤タイプの
マイクロカプセルで!!



スジキリヨトウ



シバツトガ



タマナヤガ



芝生用
殺虫剂



レインボー薬品株式会社

エンバーMC

マイクロカプセル剤

農林水産省登録 第18347号
成分：ペルメトリン(PRTR-1種) 10.0%
性状：類白色粘稠液体
毒性：普通物(毒劇物に該当しないものを指している通称)
包装：500ml×20本

エンバーMCはピレスロイド系化合物“ペルメトリン”を有効成分とする殺虫剤で、住友化学が独自の処方により開発した、全く新しいタイプの「マイクロカプセル剤」です。

特長 1

有効成分にピレスロイドを用いたことにより速効性があり、高い効果を發揮します。

特長 2

マイクロカプセル化により残効性、耐雨水性を向上し、魚毒性、薬害の軽減を可能にしました。

特長 3

有機リン剤など他剤抵抗性害虫にもよく効きます。

特長 4

薬臭がほとんどなく、プレーイヤー、散布作業者に不快感がありません。

特長 5

低温時にも高い効果を発揮します。

■適用害虫と使用方法


2020年10月現在の登録内容

*印は収穫物への残留回避のため、本剤及びその有効成分を含む農薬の総使用回数の制限を示す。

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	使用方法	総使用回数*
芝	シバツツガ	1,000~2,000倍	0.3ℓ/m ²	発生初期	散 布	3 回
	スジキリヨトウ		0.2~0.3ℓ/m ²			
	シバオサゾウムシ成虫		0.3ℓ/m ²			
	タマナヤガ	2,000倍	0.5ℓ/m ²			
	コガネムシ類幼虫	500倍	1ℓ/m ²			
	ケラ	1,000倍	0.5ℓ/m ²			

!**効果・薬害等の注意**

- 使用量、使用時期、使用方法を守る。特に初めて使用する場合は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。



- ミツバチに対する注意
 - ・巣箱及びその周辺にからないようにする。
 - ・関係機関（都道府県の農業指導部局や地域の農業団体等）に対して、周辺で養蜂が行われているかを確認し、養蜂が行われている場合は、関係機関へ農薬使用に係る情報を提供し、ミツバチの危害防止に努める。
 - ・火災時は適切な保護具を着用し消火剤等で消火に努める。
 - ・漏出時は、保護具を着用し布・砂等に吸収させ回収する。
 - ・移送取扱いは、ていねいに行う。

魚毒性等…河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意（甲殻類）

散布器具・容器の洗浄水は河川等に流さない。また、空容器等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理する。

治療法…メトカルバモール製剤の投与が有効（動物実験で報告）

保管…密栓し、直射日光を避け、食品と区別して、冷涼な所。

!**安全使用上の注意**

- 公園、堤とうなどで使用する場合、散布区域に繩囲いや立て札を立て、散布中及び散布後（最小限その当日）に関係者以外は立ち入らせない。小児、人畜等に留意する。
- 桑葉にからないように注意（蚕毒）

- ラベルをよく読む。記載以外には使用しない。小児の手の届く所には置かない。
- 空瓶は、圃場などに放置せず、3回以上水洗し（洗浄水はタンクに入れる）、適切に処理する。

■ラベルをよく読む。記載以外には使用しない。小児の手の届く所には置かない。
■使用量に合わせ薬液を調製し、使いきる。
■空瓶は、圃場などに放置せず、3回以上水洗し（洗浄水はタンクに入れる）、適切に処理する。

SCG GROUP
住友化学 アグログループ



レインボー薬品株式会社
東京都台東区上野1-19-10
TEL.(03) 6740-7777 FAX.(03) 6740-7000