

ネコソギメガ粒剤は

ココがスゴイ

① 雑草を枯らして 約6ヶ月※「生やさない」

※土壌条件、気象条件、
使用量、草の種類等
により差が生じます

② 広くまける！ 最大1400m²（一年生雑草発生前）

③ 強雑草にも効く

こんな場所で使われています




ソーラー発電用地




工場まわり




空き地



駐車場



長く効く除草剤



散布前

6ヶ月後

30g/m² 2012年10月散布



7kg入

除草剤 **ネコソギメガ** 粒剤

除草剤 **ネコソギメガ** 粒剤 の効果・効能

- 非選択性の土壌処理型除草剤で雑草の地下部まで枯らし、長期間雑草の発生を抑えます。
- 効き目は天候や土壌条件により異なりますが、約30日前後でほとんど枯らし、長期間（4～6ヶ月）雑草の発生を抑えます（散布時期や使用量により、効果に差が生じます）。

商品名	ネコソギメガ粒剤
農林水産省登録	第23620号
農薬の種類	カルブチレート・ブロマシル・MCPP粒剤
有効成分	カルブチレート 1.5% ブロマシル 2.0% MCPP 1.5%
性状	類白色細粒

**3種類の有効成分が、しっかり雑草を枯らし、
長期間雑草が生えるのを防ぎます。**


使用方法

- 雑草発生前では1㎡当り5～10g（1坪当り約16.5～33g）を、雑草の生育初期では1㎡当り15～30g（1坪当り約49.5～99g）を均一に土壌に散布します。
- ササやススキなどの多年生イネ科雑草に対しては、生育初期に、1㎡当り30～60g（1坪当り約99～198g）を均一に土壌に散布します。

point


**散布時期は
雑草の
生える前から
生育初期**

- 雑草が生える前から生え始め（めやす：草丈20cm以下のとき）に散布してください。




- 次の雑草には効果が劣ります。

■ クズ等つる性植物



■ イタドリ等地下茎が極端に発達する植物



- 晩秋から早春の低温時には、効果が現れるまでに1か月ほどかかることがあります。

適用雑草と使用方法

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	使用量	本剤の使用回数	使用方法	カルブチレートを含む農薬の総使用回数	ブロマシルを含む農薬の総使用回数	MCPPを含む農薬の総使用回数
樹木等	公園 庭園 堤とう 駐車場 道路 運動場 宅地等	一年生雑草	雑草発生前	5～10g/㎡	2回以内	植栽地を除く 樹木等の周辺地に 全面土壌散布	2回以内	2回以内	3回以内
		多年生広葉雑草	雑草生育初期 (草丈20cm以下)	15～30g/㎡					
		多年生イネ科雑草	雑草生育初期 (草丈30cm以下)	30～60g/㎡					