

ダイヤモンド®

農林水産省登録 第23742号

水和剤

トルクロホスメチル・マンデストロビン水和剤


Golf Course

ダラースポット病に卓効!
炭疽病やブラウンパッチにも

異なる作用の2成分配合!
安定した効果を発揮

持続効果が長い!
(委託試験・自社試験の結果から)

治療効果も発揮!
病害発生初期の散布が可能



ダラースポット病治療自社試験 処理17日後
(2016年5月26日散布、6月12日調査)



芝生用
殺菌剤



レインボー薬品株式会社

2つの有効成分が安定した効果を発揮！

ディアママンテ[®] 水和剤

農林水産省登録 第23742号
成分：トルクロホスメチル 40.0%
マンデストロビン 10.0%
性状：類白色水和性粘稠懸濁液体
毒性：普通物（毒劇物に該当しないものを指していう通称）
包装：500ml×10本

■ 特 長

①

※
2つの有効成分が
安定した効果を発揮

※作用性が異なる
トルクロホスメチルと
マンデストロビン

②

ローテーションの
偏りを減らし、
耐性菌の
発達を防ぐ！

③

ダラースポット病に
卓効を示す他
炭疽病やブラウンパッチ、
フェアリーリング病にも
効果あり！

■ 適用病害と使用方法

（2019年7月現在の登録内容）

作物名	適用病害名	使用量		使用時期	使用方法	総使用回数※	
		薬量	希釈水量				
日本芝	カーブラリア葉枯病	0.5ml/m ²	0.5ℓ/m ²	発病初期	散布	本剤及び トルクロホスメチル を含む農薬	マンデストロビン を含む農薬
西洋芝 (ベントグラス)	葉腐病 (ブラウンパッチ) 炭疽病		0.05～0.5ℓ/m ²				
	ダラースポット病		1.0ℓ/m ²				
	フェアリーリング病						
						5回以内	8回以内

※は本剤及びそれぞれの有効成分を含む農薬の総使用回数の制限を示す。

⚠ 効果・薬害等の注意

- ・使用前に容器をよく振る（沈殿）
- ・散布液調製後は速やかに使用する（分解）
- ・使用量、使用時期、使用方法を守る。特に初めて使用する場合は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。

保 管…密栓し、直射日光をさけ、食品と区別して、冷涼な所。

空容器は圃場などに放置せず適切に処理する。

⚠ 安全使用上の注意

- ・皮ふに付着しないように注意。皮ふに付いた場合は直ちに石けんでよく洗い落とす（弱い刺激性）
- ・公園などで使用する場合、散布区域に縄囲いや立て札をたて、散布中および散布後（最小限その当日）に関係者以外は立ち入らせない。小児、人畜等に留意する。

■ラベルをよく読む。 ■記載以外には使用しない。 ■小児の手の届く所には置かない。

SCC GROUP
住友化学 アグログループ



レインボー薬品株式会社

東京都台東区上野 1-19-10
TEL. (03) 6740-7777 FAX. (03) 6740-7000