

こっばみじんシャワー

ラベルをよく読む。記載以外には使用しない。小児の手の届く所には置かない。

農林水産省登録 第 23434 号
農薬の名称 こっばみじんシャワー
農薬の種類 グリホサートイソプロピルアミン塩液剤

成分 ・グリホサートイソプロピルアミン塩・・・0.40%
[イソプロピルアンモニウム=N-(ホスホノメチル)グリシナート]
・水、色素等・・・・・・・・・・・・・・・・99.6%

性状 淡青色澄明水溶性液体

特長

- ・ アミノ酸系成分であるグリホサートイソプロピルアミン塩が、雑草の葉から吸収されて根まで枯らします。
- ・ 土に落ちた成分は土壌微生物によって分解され、土壌を介して他の植物に影響を与えることはありません。
- ・ 嫌な臭いがほとんどありません。

散布上のポイント

- ・ 薄めず原液のまま、**雑草の茎葉全体にしっかりと薬液がかかるように散布**してください。(事前に雑草は刈り込まないでください)
- ・ 葉から成分が吸収され徐々に根まで枯らすので、1～2週間そのままにしておいてください。
- ・ 散布液が出にくい場合は、ボトル側面を軽く押してください。
- ・ 天気の良い日に散布してください。散布後6時間以内に雨が降ると成分が流されて効果が劣ることがあります。

適用雑草と使用方法						
作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	使用量	使用方法	総使用回数 ※
樹木等	公園 庭園 堤とう 駐車場 道路 運動場 宅地 のり面等	一年生及び 多年生雑草	雑草生育期 (草丈30cm以下)	50~100 ml /m ² (原液散布)	植栽地を除く 樹木等の 周辺地に雑 草茎葉散布	3回以内

※は本剤及びグリホサートを含む農薬を、年間に同一場所に使用できる総使用回数の制限を示す。

効果・薬害等の注意

- グリホサートを含む農薬であるので、他のグリホサートを含む農薬の使用回数と合わせ、作物ごとの総使用回数の範囲内で使用する。
- 土壌中で速やかに不活性化するので、雑草の発生前処理効果はない。
- 散布時の雑草の草丈や葉面積が大きいほど、効果が確実となるので、**散布前に雑草の地上部を刈り払わない。**
- 通常2~14日で効果が発現し、効果完成までさらに日数を要するので、誤って再散布しない。
- 処理後6時間以内の降雨は効果を低下させることがあるので、天候をよく見極めて散布する（効果）
- 植物に薬液が付着すると薬害が生じるので、散布液が付近の農作物、樹木の茎葉に飛散しないように散布する（薬害）
- 多年生雑草のうち、**スギナには効果が劣る**ので留意する。
- 水源池、養殖池等に本剤が飛散、流入しないよう十分に注意する。
- 散布器具、容器の洗浄水は河川等に流さず、空の容器は環境に影響のないよう適切に処理する。
- 使用量、使用時期、使用方法を守る。特に初めて使用する場合は、病虫害防除所または販売店と相談することが望ましい。

安全使用上の注意

- 眼に入らないように注意。眼に入った場合は直ちに水洗し、眼科医の手当を受ける（刺激性）
- 皮ふに付着に付着しないように注意。皮ふに付いた場合は直ちに石けんでよく洗い落とす（刺激性）
- 散布時は、農薬用マスク、手袋、長ズボン・長袖作業衣などを着用する。
- 作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをして、洗眼する。
- 公園などで使用する場合、散布区域に縄囲いや立て札をたて、散布中および散布後（最小限その当日）に関係者以外は立ち入らせない。小児、人畜等に留意する。
- 使用残りの薬剤は必ず安全な場所に保管。

保管・・・密栓し、直射日光をさけ、食品と区別して、冷涼な所。
横にしないで立てて保管する。

★使用後の空容器は3回以上洗浄してから処理する。

★空容器には他の薬剤を入れない。