

# ネコソギWクイック

実際に使用する際は必ず商品ラベルをよく読み、記載内容に従ってお使いください。

農林水産省登録 第 21993 号

農薬の名称 ネコソギWクイック

農薬の種類 グリホサートイソプロピルアミン塩・フルミオキサジン粉粒剤

## 成分

- ・ グリホサートイソプロピルアミン塩・・・3.0%
- [イソプロピルアンモニウム=N- (ホスホノメチル) グリシナート]
- ・ フルミオキサジン・・・・・・・・0.10%
- [N - (7 - フルオロ - 3,4 - ジヒドロ - 3 - オキソ - 4 - プロパ - 2 - イニル - 2H - 1,4 - ベンゾキサジン - 6 - イル) シクロヘキサ - 1 - エン - 1,2 - ジカルボキシミド]
- ・ 鉱物質微粒等・・・96.9%

性状 類白色微粒

## 適用雑草と使用方法

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	使用量	使用方法	総使用回数※	
						本剤およびフルミオキサジンを含む農薬	グリホサートを含む農薬
樹木類	—	一年生雑草	雑草生育期	10~20 g/m <sup>2</sup>	雑草茎葉散布	4回以内	
樹木等	公園 庭園 堤とう 駐車場 道路 運動場 宅地 鉄道等	多年生広葉雑草		10~20 g/m <sup>2</sup>	植栽地を除く樹木等の周辺地に雑草茎葉散布	3回以内	3回以内
				20~30 g/m <sup>2</sup>			

※は本剤及びグリホサート、フルミオキサジンを含む農薬を、年間に同一場所に使用できる総使用回数の制限を示す。

- 枯れやすい一年生雑草には 1 m<sup>2</sup>当り 10~20g (1 坪当り 33~66g)、しつこい多年生広葉雑草には 1 m<sup>2</sup>当り 20~30g (1 坪当り 66~99g) を、本剤が雑草の葉や茎に付着するように散布します。
- 朝露がおりたときや降雨の後など、雑草の茎葉が湿っている状態で散布してください。本剤がよく付着するので効果が高まります

### 効果・薬害等の注意

- 雑草が大きくなりすぎると効果が劣るので、雑草の草丈が 50cm 以下の生育期に散布する。
- 雜草の茎葉が湿った状態で使用する（効果）
- 作物の茎葉に付着すると薬害を生じるので、かからないよう十分注意して散布する。
- 播種予定地では使用しない（薬害）
- 強風時の散布は薬剤が飛散して、周囲の植物に薬害を生じるおそれがあるのでさける。
- 散布後の多量の降雨は効果にむらを生じたり、有用植物に薬害を生じるおそれがあるので、天候を見極めてから散布する。
- 本剤が水田に流入すると、稻が枯れるので十分注意する。
- ハウス等の施設内及びその周辺では使用しない。[施設内使用禁止マーク]
- 急な傾斜地では使用しない。
- 水源池、養殖池等に本剤が飛散・流入しないよう十分に注意する。
- 自動車、カラートタン、壁、ペット、洗濯物、玩具などにかからないように注意する。
- 使用量に合わせ秤量し、使い切る。散布器具、容器の洗浄水は河川等に流さない。空容器は環境に影響のないよう適切に処理する。
- 樹木類に属する作物又はその新品種に使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認する。使用方法等を厳守する。特に初めて使用する場合は、病害虫防除所または販売店と相談することが望ましい。

### 安全使用上の注意

- 散布の際は農薬用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用する。[マスク着用マーク]  
作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをする。
- 公園、堤とうなどで使用する場合、散布区域に縄張りや立て札をたて、散布中および散布後（最小限その当日）に関係者以外は立ち入らせない。小児、人畜等に留意する。
- 使用残りの薬剤は必ず安全な場所に保管する。

魚毒性等・・・河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用する（藻類）

保管・・・・密封し、直射日光をさけ、食品と区別して、冷涼・乾燥した所。