

平成26年 10月 28日

お得意様 各位

レインボー薬品株式会社

スミフェート粒剤の登録内容変更に関するご案内

拝啓

時下ますますご隆盛の段、お喜び申し上げます。平素は格別のご指導を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて首記の件、ご愛顧頂いております殺虫剤『スミフェート粒剤』について、下記のとおり登録内容の一部が変更されることとなりましたので、ご連絡申し上げます。

なお、このたびの登録内容の変更は、使用方法が制限されるものが含まれますので、登録変更の予定につきまして、利用者様及びお取扱い窓口各位への周知徹底につきご協力を賜りたく、よろしくお願い申し上げます。

敬具

記

1. 対象となる農薬

スミフェート粒剤 (種類名：アセフェート粒剤、登録番号 第21904号)

2. 登録変更の時期 (予定)

平成26年11月17日(月)

3. 登録変更の内容

【変更内容 (今回の使用制限変更にかかる部分のみ)】

- ① 作物名「キャベツ」の「適用病害虫名」、「使用時期」、「本剤の使用回数」、「使用方法」及び「アセフェートを含む農薬の総使用回数」をそれぞれ「ハイマダラノメイガ」を削除し、「定植時及び生育期 但し、収穫21日前まで」から「定植時」に、「3回以内」から「1回」に、「定植時植穴処理及び生育期葉面散布」から「植穴処理」に、及び「3回以内」から「2回以内 (定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は1回以内)」に変更する。
- ② 作物名「はくさい」の「使用時期」、「本剤の使用回数」、「使用方法」及び「アセフェートを含む農薬の総使用回数」をそれぞれ「定植時及び生育期 但し、収穫21日前まで」から「定植時」に、「3回以内」から「1回」に、「定植時植穴処理及び生育期株元散布」から「植穴処理」に、及び「3回以内」から「1回」に変更する。
- ③ 作物名「ブロッコリー」の「使用時期」、「本剤の使用回数」、「使用方法」及び「アセフェート含む農薬の総使用回数」をそれぞれ「定植時及び生育期 但し、収穫14日前まで」から「定植時」に、「3回以内」から「1回」に、「定植時植穴処理及び生育期株元散布」から「株元散布」に、及び「3回以内」から「1回」に変更する。
- ④ 作物名「だいこん」の「使用方法」及び「アセフェートを含む農薬の総使用回数」をそれぞれ「は種前作条散布」から「作条散布」に、及び「2回以内 (は種前及びは種時の処理は合計1回以内)」から「1回」に変更する。
- ⑤ 作物名「かぶ」の「使用時期」及び「使用方法」をそれぞれ「収穫14日前まで」から「収穫21日前まで」に、及び「生育期葉面散布」から「株元散布」に変更する。

- ⑥ 作物名「なばな」の「使用方法」を「定植時土壌混和处理」から「土壌混和处理」に変更する。
- ⑦ 作物名「きゅうり、トマト、なす」の「使用時期」、「本剤の使用回数」、「使用方法」及び「アセフェートを含む農薬の総使用回数」をそれぞれ「定植時及び生育期 但し、収穫前日まで」から「定植時」に、「3回以内」から「1回」に、「定植時作条散布又は植穴散布、生育期株元散布」から「作条散布又は植穴処理」に、及び「3回以内」から「1回」に変更する。
- ⑧ 作物名「ミニトマト」を削除する。
- ⑨ 作物名「みずな」の「使用方法」及び「アセフェートを含む農薬の総使用回数」をそれぞれ「定植時作条散布後土壌混和」から「作条散布後土壌混和」に、及び「2回以内（定植時は1回以内）」から「1回」に変更する。
- ⑩ 作物名「ばれいしょ」の「アセフェートを含む農薬の総使用回数」を「5回以内（植付時の処理は1回以内、植付後は4回以内）」から「3回以内（植付時の処理は1回以内、植付後は2回以内）」に変更する。
- ⑪ 作物名「こまつな」の「使用方法」を「は種前作条散布後土壌混和」から「作条散布後土壌混和」に変更する。
- ⑫ 作物名「チンゲンサイ」の「使用方法」を「定植時作条散布後土壌混和」から「作条散布後土壌混和」に変更する。

以上

○スミフェート粒剤

平成26年11月17日に登録が下りた後の変更箇所を含む、全登録内容を掲載。

変更後の【適用病害虫と使用方法】

*印は収穫物への残留回避のため、アセフェートを含む農薬の総使用回数の制限を示す。

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	使用方法	総使用回数*		
					本剤	アセフェート剤	
キャベツ	アオムシ、ヨトウムシ コナガ、アブラムシ類	3~6 kg/10a (1株当り1~2g)	定植時	植穴処理	1回	2回 (定植時までの処理は1回、 定植後の散布は1回)	
はくさい				株元散布			
ブロッコリー	ヨトウムシ	6 kg/10a (1株当り2g)	株元散布				
だいこん	アオムシ コナガ アブラムシ類	3~4 kg/10a	は種前	作条散布			
かぶ	アブラムシ類	4 kg/10a	収穫21日 前まで	株元散布			
なばな		6 kg/10a (1株当り2g)	定植時	土壌混和处理			
きゅうり なす	アブラムシ類 アザミウマ類 オンシツコナジラミ	3~6 kg/10a (1株当り1~2g)	定植時	作条散布 又は 植穴処理			
トマト	オンシツコナジラミ アブラムシ類						
みずな	アブラムシ類	3~6 kg/10a	定植時	作条散布後 土壌混和			3回 (植付時処理は1回、 植付後は2回)
ばれいしょ			植付時	作条散布			
こまつな			は種前	作条散布後			
チンゲンサイ			定植時	土壌混和	1回		
ごぼう			収穫75日 前まで	株元散布	1回	2回 (株元散布は1回、 散布は1回)	
たばこ	移植前	作条散布後 土壌混和	2回				
きく	アブラムシ類 アザミウマ類 マメハモグリバエ	6~9 kg/10a	発生初期	株元散布	5回		
ばら	アブラムシ類	1株当り 1~2g					
ゆり	アブラムシ類						
トルコギキョウ	アザミウマ類	1株当り2g					
りんどう	アザミウマ類						
つつじ類	ツツジゲンバイ						
芝	スジキリヨトウ シバツトガ	10 kg/10a	全面散布				
	タマナヤガ	5~10 kg/10a					

: 制限事項