

コケレス粒剤

使用前にはラベルをよく読む。ラベルの記載以外には使用しない。
小児の手の届く所には置かない。

用 途 : コケの駆除

※非農耕地用。農薬として使用することはできませんので、
農作物や樹木・芝・花き等の植物栽培地では使えません。

性 状 : 淡黄色微粒

成 分 : 陽イオン界面活性剤

容 量 : 450g(目安 2.3~4.5 m²(約 0.7~1.4 坪))



【特 長】

- 土壤に発生したゼニゴケを1週間ほどで枯らし、最長3カ月間発生を抑えます(散布時期、コケの発生程度、使用量等により差が生じる)。
- ムラなく散布ができる微粒剤タイプです。
- ゼニゴケだけではなく、コケ類全般に効果が期待できます。

【使い方】

- 駆除したいコケの表面がしっかりと覆われるように本剤を均一に散布してください。(図1)
- 1 m²あたり本剤 100~200gが標準使用量です。状況に応じて使用量を加減してください。
- 朝露がおりた時や降雨の後など、コケが湿っている状態で散布すると効果的です。コケに水をかけてから本剤を散布してもよいです。
- 厚いコケが発生している場合や効果が不十分な場合には、繰り返し散布してください。
- 通常、散布してから1週間ほどで効果が現れますが、コケの発生程度や気象条件によって日数は異なります。




図1.散布量目安(200g/m²散布時)

【使用上の注意】

- コケ駆除の用途以外に使用しないでください。
 - 土壌に発生したコケに使用するのがおすすめです。コンクリートやブロック等の土壌以外の場所を使用すると粒が残ります。
 - 石材、タイル等の上に使用する場合は、あらかじめ目立たない場所に使用し、変色等異常が出ないことを確認のうえ散布してください。
 - 使用の際は手袋を着用し、なるべく身体の露出部を少なくして薬剤がかからないようにするとともに、マスクを着用して粉じんを吸い込まないように注意してください。
- 
- 使用時は保護メガネを着用し、粉じんが眼に入らないように注意してください。眼に入った場合は、直ちに水でよく洗い流してください。
 - 使用後あるいは皮ふに付いたときは、石けんと水でよく洗い、うがいをしてください。万一身体に異常を感じた場合は医師に相談してください。
 - かぶれやすい人は使用しないでください。
 - ボトル内で薬剤が固まってしまった場合は、ボトルを振ってから散布してください。
 - 酸性の製品、酢、アルコール、アンモニア等、他の薬品や洗剤と混ぜないでください(ガスが発生したり、効果が薄れることがある)。
 - 散布後最低 1 日は散布場所に入らないでください。
 - 人、ペット、洗濯物、玩具などにかからないようにしてください。
 - 自動車や金属製品にかかるとシミやサビの原因になるおそれがあるので、かからないようにしてください。万一かかってしまった場合は水洗いしてください。水洗いできないものには使用しないでください。
 - 池、水槽、河川等へ薬剤が飛散しないように注意してください。
 - 散布後の多量の降雨は効果にムラが生じるので、天候を見極めて散布してください。
 - 傾斜地では使用しないでください。

【使用場所のイメージ】

土に生えたゼニゴケ

