

ネコソギ W クイック微粒剤

使用前にはラベルをよく読む。ラベルの記載以外には使用しない。小児の手の届く所には置かない。

農林水産省登録 第 2 1 9 9 3 号
農薬の名称 ネコソギWクイック微粒剤
農薬の種類 グリホサートイソプロピルアミン塩・フルミオキサジン粉粒剤

成分 ・グリホサートイソプロピルアミン塩・・・・・・・・・3.0％
・フルミオキサジン・・・・・・・・・・・・・・・・・0.10％
・鉱物質微粉等・・・・・・・・・・・・・・・・・ 96.9％

性状 類白色微粒

適用雑草と使用方法

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	使用量	使用方法	総使用回数※	
						本剤およびフルミオキサジンを含む農薬	グリホサートを含む農薬
樹木類	—	一年生雑草	雑草生育期	10～20 g／㎡	雑草茎葉散布	3 回以内	4 回以内
樹木等	公園 庭園 堤とう 駐車場 道路 運動場 宅地 鉄道等	多年生広葉雑草		20～30 g／㎡	植栽地を除く樹木等の周辺地に雑草茎葉散布		3 回以内
日本芝（こうらいしば）	—	一年生雑草 多年生広葉雑草	芝生育休止期（雑草生育期）	10～30 g／㎡	雑草茎葉散布	2 回以内	

※は本剤およびそれぞれの有効成分を含む農薬を、年間に同一場所に使用できる総使用回数の制限を示す。

効果・薬害等の注意

- 雑草が大きくなりすぎると効果が劣るので、雑草の草丈が 50cm 以下の生育期に散布する。
- 雑草の茎葉が湿った状態で使用する（効果）
- 作物の茎葉に付着すると薬害を生じるので、かからないよう十分注意して散布する。
- **日本芝(こうらいしば)に使用する場合、葉鞘褐変等の薬害を生じるおそれがあるので、芝生育休止期以外の時期には使用しない。**なお、芝生育休止期とは、茎葉の一部に緑色が残っていても生育が停滞している時期を指す。
- 播種予定地では使用しない（薬害）
- 強風時の散布は薬剤が飛散して、周囲の植物に薬害を生じるおそれがあるので、さける。
- 散布後の多量の降雨は効果にむらを生じたり、有用植物に薬害を生じるおそれがあるので、天候を見極めてから散布する。
- 本剤が水田に流入すると、稲が枯れるので十分注意する。
- ハウス等の施設内及びその周辺では使用しない。
- 急な傾斜地では使用しない。
- 水源池、養殖池等に本剤が飛散、流入しないよう十分に注意する。
- 自動車、カラートタン、壁、ペット、洗濯物、玩具などにかからないように注意する。
- 使用量に合わせ秤量し、使い切る。散布器具、容器の洗浄水は河川等に流さない。空容器は環境に影響を与えないよう適切に処理する。
- 樹木類に属する作物又はその新品種に使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認する。使用方法等を厳守する。特に初めて使用する場合は、病虫害防除所または販売店と相談することが望ましい。



安全使用上の注意

- 散布の際は農薬用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用する。
作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをする。
- 公園、堤とうなどで使用する場合、散布区域に縄囲いや立て札をたて、散布中および散布後（最小限その当日）に関係者以外は立ち入らせない。小児、人畜等に留意する。
- 使用残りの薬剤は必ず安全な場所に保管する。



魚毒性等・・・河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用する（藻類）

保管・・・密封し、直射日光をさけ、食品と区別して、冷涼・乾燥した所。